

ベージニオ®を服用される患者さんへ

ベージニオ錠の服用により下痢が高頻度に起こります。
下痢の対策として、はじめに基本の2つのお薬が処方されます。

基本の薬の飲み方

ベージニオ錠での治療を始める際には、
下痢の予防のため、整腸剤も一緒に開始します。

●ミヤBM®錠 1回2錠 1日3回 毎食後

・整腸剤は、便通の状況をみながら 徐々に減らしたり止めることができます。

下痢はベージニオ開始1週間前後に起こることが多いので、
症状がなくてもまずは予防的に飲み続けましょう

ミヤBM錠を服用していても泥状や水様の下痢が起こった場合には、
下痢止めを頓服でお飲みください。

●ロペラミド 1mg 1回1錠

・飲むタイミングは裏面をご確認ください。

下痢は我慢せず
早めにロペラミドを
飲んで下さい



* 普段から便秘薬を服用している方は、下痢の傾向がみられたら
便秘薬を減らしたり中止するなど調節をしてください。

Point

以下の場合はベージニオの服用を中止し、病院に速やかに連絡してください。



✓激しい腹痛 ✓発熱、嘔吐 ✓飲食が出来ない
✓血便、黒色便 ✓めまいやだるさが強い

病院の連絡先

医療機関名

長崎医療センター

代表番号

0957-52-3121

リリーお薬相談窓口

お薬服用中の患者さん、ご家族が治療生活中で困ったときに無料でご相談いただけます。

電話

0120-526-062
(365日年中無休/9~21時)

ご登録やお手続きは必要ありません。
お気軽にお電話ください。

動画

ベージニオを服用される患者さんとご家族へ

<https://www.lilly.co.jp/product-lineup/verzenio-1>



ベージニオ®を服用される患者さんへ

ベージニオによる下痢症状が出たら、

こまめに水分補給をして、早めに下痢止めの薬を使いましょう。

ベージニオ内服開始の一週間前後に下痢が起きやすくなっています。



便の性状

①コロコロ便



硬くてコロコロの
兔糞状の便

②硬い便



ソーセージ状で
あるが硬い便

③やや硬い便



表面にひび割れのある
ソーセージ状の便

④普通便



表面がなめらかで
やわらかい
ソーセージ状の便

⑤やや軟らかい便



はっきりとした
断片のあるやわらかい
半分固形の便

⑥泥状便



端が崩れて、
ふにやふにやの
不定形の便

⑦水様便



固体物を含まない
液体状の便

目標

下痢

(Step 1) ロペラミドの使い方

下痢(上の図の⑥泥状便、⑦水様便)になったとき、ロペラミドを **1錠** 内服

↓ 2時間以上経過

下痢がおさまらないとき、ロペラミドを **1錠** 追加で内服

↓ 2時間以上経過

下痢がおさまらないとき、ロペラミドを **1錠** 追加で内服

↓ 2時間以上経過

下痢がおさまらないとき、ロペラミドを **1錠** 追加で内服

↓ 2時間以上経過

1日のうち、ロペラミドを **4回** 繰り返し服用しても
下痢がおさまらない時や、おなかが痛いときは、
ベージニオは服用せずに、病院に速やかに連絡してください。

下痢がおさまれば
ロペラミドの服用は終了

ロペラミドは
最大1日4回まで

(Step 2) ライフスタイルに合わせた 下痢止めの薬の使い方・服用タイミング

ケース 1

いつも決まった時間帯に
下痢になっている場合

(例)午前中に下痢が起こる場合
▶ 朝食後に下痢止めを服用する



ケース 2

自宅にいるときはよいが、外出
するときに心配になるような場合

▶ いつでも服用できるように
下痢止めを携帯する。
▶ 外出前に下痢止めを服用する。

